



馴化苗圃栽培管理要點

80 年元月 15 日

一、苗圃環境衛生：

- (一) 假植前一星期清除苗圃內外環境雜物並以清水沖洗後撒施強力漂白粉並封鎖大門。
- (二) 檢查網室接縫及大門，如有間隙立即改善補密，以妨害蟲乘隙進入。
- (三) 培養土置放及裝土處嚴防閒雜人靠近。
- (四) 回收假植鉢以水沖洗後浸入次氯酸鈉消毒液廿四小時後方可使用。
- (五) 門口處置放工作鞋，並嚴禁非工作人員進入，以防病菌帶入蔓延。
- (六) 供苗後之空間立即以水沖洗，以待第二批蕉苗馴化。

二、裝土：

以裝滿假植鉢平面為準（約 0.4 公斤）後擺置於苗圃，每鉢間距離為 2.5 公分。

三、假植：

- (一) 假植前充分澆水，培養土即呈假植鉢之八分滿為宜，如發現流失不足時必須填補。並於第一次噴水後蕉苗倒伏時立即扶正。
- (二) 蕉苗假植不宜太深，以覆蓋根部為原則。

四、水分：

假植後即噴水，如噴灑不及之處另以澆水桶補充，爾後每天以施噴二次為宜，其給水時間及水量視天候氣溫自定之。

五、肥料：

- (一) 假植前每鉢施放 15~20 粒之仙肥（約 3 克）。
- (二) 假植一星期蕉苗成活後，以力寶 500~700 倍液肥噴施，連續每隔 7~10 天噴四次。但苗圃設有黑色遮光網時，必須待拆網後蕉苗接觸陽光一星期始可噴施，以免發生肥害。

六、病蟲害防治：

- (一) 假植後二週以加保扶（好年冬）3%粒劑撒施，每鉢約 0.05~0.1 克，並於供苗前 15 天再撒，以防蟲害。
- (二) 假植後一星期起噴施大生 M-45 500 倍可濕性粉劑液體，每隔 10 天連續噴施，以防病害。

七、除草、理苗：

- (一) 除草是減少肥料損失工作項目，應隨時執行。
- (二) 整理優劣苗及條理高低整齊苗，以供蕉農種植。（台灣香蕉研究所）