



## 提姆颱風過境後之受害蕉園復舊措施

香蕉研究所 趙治平

### 一、植株尚未抽穗

- (一) 排水不良之蕉園，應儘速設法排除園中積水。
- (二) 風害雨水兩項因素將加速黑星病及葉斑病之蔓延，應將折斷葉片割除後，立即進行噴藥防治，至十月底前每兩星期應噴藥一次。施用之藥劑配方及種類為：
  1. 每公頃施用 25% 普克利乳劑 0.4 公升，+水稀釋至 30 公升。
  2. 每公頃施用 80% 鋅錳乃浦可濕性粉劑 2 公斤+礦物油 4 公升+出來通 48 公撮，加水至 30 公升。
  3. 每公頃施用 28% 比多晨乳劑 0.42 公升，+礦物油 6 公升+出來通 72 公撮，加水至 30 公升。
- (三) 將傾斜蕉株或倒伏之小蕉株扶正，以期在明年外銷季節採收；折斷之蕉株則應砍除，再留二代吸芽已緩不濟急。
- (四) 加強清理蕉園，颱風後折斷殘株、枯葉及倒伏無用之植株，應隨時清理，避免導致象鼻蟲為害。
- (五) 於災害後約十天，每株施用尿素 100 至 150 公克，四號複合肥料於尿素施用一星期後繼續施用，以促進新葉生長，加速蕉株恢復生機。

### 二、植株已抽穗

- (一) 倒伏之抽穗株，若果實熟度已在五、六分以上，可以採收部份。但蕉果必需以乾蕉葉覆蓋，以免日燒。接近地面蕉果下面，襯墊乾葉或稻草，避免與泥土接觸。
- (二) 整株傾斜者，速以交叉支柱扶助，並行疏果，根部覆土。