

香蕉抽穗至採收日數表 (中部蕉區適用)

節氣	白露	秋分	寒露	霜降	立冬	小雪	大雪	冬至	小寒	大寒	立春	雨水	驚蟄	春分	清明	穀雨	立夏	小滿	芒種	夏至	小暑	大暑	立秋	處暑
抽穗月	九月	十月	十月	十一月	十一月	十二月	十二月	一月	一月	二月	二月	三月	三月	四月	四月	五月	五月	六月	六月	七月	七月	八月	八月	八月
抽穗旬	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
四季蕉名	秋蕉	冬蕉	花龍	花龍	花龍	花龍	花龍	黑皮	黑皮	白皮	白皮	大頭	大頭	大頭	大頭	尖尾	尖尾	尖尾	尖尾	尖尾	尖尾	尖尾	尖尾	尖尾
採收月	一月	二月	二月	三月	三月	四月	四月	五月	五月	六月	六月	七月	七月	八月	八月	九月	九月	十月	十月	十一月	十一月	十二月	十二月	十二月
採收日數	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二

冬蕉=秋分-寒露之間出穗
花龍仔蕉=寒露-大雪之間出穗
黑皮春蕉=大雪-大寒之間出穗
白皮春蕉=大寒-雨水之間出穗
大頭夏蕉=驚蟄-春分之間出穗
大頭夏蕉=春分-清明之間出穗
尖尾夏蕉=清明-夏至之間出穗
秋蕉=小暑-白露之間出穗

財團法人台灣香蕉研究所
行政院農業委員會補助

香蕉葉片生長對產量之關係

(公斤)

葉數	段數	指數	重量	每段果實平均重量
2.1-3.0	4.00	53.00	2.45	0.61
3.1-4.0	3.30	54.80	3.78	0.99
4.1-5.0	4.06	53.91	4.53	1.12
5.1-6.0	5.21	71.96	7.92	1.52
6.1-7.0	6.55	92.46	11.64	1.78
7.1-8.0	7.03	99.23	13.37	1.90
8.1-9.0	7.42	108.33	16.44	2.22
9.1-10.0	6.82	120.55	16.61	2.44
10.1-11.0	6.94	109.42	17.34	2.50
11.1-12.0	6.97	111.21	17.54	2.52
12.1-13.0	7.32	116.91	17.91	2.45
13.1-14.0	7.69	119.91	16.34	2.12
15.1-16.0	7.00	123.00	14.05	2.01

中部香蕉各月份葉數生長情形


月份	生長葉數(片)	月份	生長葉數(片)	月份	生長葉數(片)	月份	生長葉數(片)
1	0.52	4	2.48	7	3.64	10	2.90
2	0.95	5	2.83	8	3.96	11	1.69
3	1.31	6	3.57	9	3.93	12	1.02

中部平地香蕉栽植時期與四季蕉名之關係

栽種時期	生產明年蕉名	栽種時期	生產明年蕉名	備註
2月~3月中旬	冬蕉	5月下旬~7月中旬	夏蕉	山地香蕉栽植時期，因海拔氣溫之高低及可否引水灌溉等環境不同其栽植時期參照本表可提早1~2月栽植
3月下旬~5月中旬	春蕉	7月下旬~9月中旬	秋蕉	


中部平地香蕉留萌時期與四季蕉名之關係

留萌時期	生產明年蕉名	留萌時期	生產明年蕉名	備註
2月~3月中旬出生之萌芽	春蕉	8月~9月	秋蕉	山地香蕉留萌時期，因海拔氣溫之高低及可否引水灌溉等環境不同，可參照本表可提早1~2月栽植
5月下旬~7月	夏蕉	12月~2月	冬蕉	



(高屏蕉區適用)

行政院農業委員會農糧署補助



	公尺 2.1	公尺 2.3	公尺 2.4	公尺 2.6	公尺 2.7	公尺 3.0
	尺 (7.5)	尺 (7.5)	尺 (8.0)	尺 (8.5)	尺 (9.0)	尺 (10.0)
公尺 2.1	2222	—	—	—	—	—
2.3	2074	1936	—	—	—	—
2.4	1945	1815	1702	—	—	—
2.6	1830	1708	1601	1507	—	—
2.7	1729	1613	1513	1424	1344	—
3.0	1556	1452	1361	1281	1210	1089

白露秋蕉	秋蕉	尖尾夏仔蕉	大躑夏仔蕉	大頭夏仔蕉	白皮春蕉	黑皮春蕉	”(花龍仔)	冬蕉
立秋——秋分之間出穗	夏至——立秋之間出穗	立夏——夏至之間出穗	立夏前二十日間出穗	春分起二十日間出穗	立春——春分之間出穗	冬至——立春之間出穗	立冬——冬至之間出穗	秋分——立冬之間出穗