



莎拉颱風過後蕉園緊急處理事項

一、植株與支柱傾斜者，迅速扶正或增立一支柱，預防風雨後，土質鬆軟而再度倒伏。

二、已結果的植株：

- (一) 植株葉片被風吹裂成絲狀，而植株無折損的，視植株被害狀況，酌行疏果 1~3 段，以促進其餘果實發育。
- (二) 植株折彎，但中心果軸未斷，且果實熟度已達 3~4 分的，用支柱支撐果實並需疏果 2~4 段。
- (三) 整株倒伏：果實熟度在 4~5 分以上的，即刻以稻草或蕉葉墊於果實下面，以免腐爛，同時以蕉葉覆蓋果實以防曬傷。

三、將要抽穗的植株：如僅是葉片被吹成絲狀將來抽穗後須疏果，如植株已折斷或倒伏，應該砍掉，促進旁邊子芽的發育。

四、幼小的植株：植株不超過 1.2 公尺者，風後傾斜者即扶正，並立支柱；倒伏或整株被風拔起，可重新種植，剪除部份葉片，以免水份蒸發葉片枯萎影響成活。

五、加強田間管理作業：

- (一) 採取早產期措施：莎拉颱風過境，蕉園普遍受害，葉片破裂，根部浸水，必使明年期延後，產量減少，請參考果農合作 491 期內容加強田間肥培管理。
- (二) 施肥：颱風過後，因根部折斷勿立即施肥，待 10~15 天後，新根長出才可施肥，以促進生長。
- (三) 排水：風後立即將積水排除，以免根部浸水腐爛。
- (四) 加強疏果：風後，蕉株的根、莖、葉均受損，會影響生長結果，故必多行疏果，以利提前採收及維護香蕉品質。
- (五) 風雨過後，割除病葉，並立即噴藥防治黑星病、葉斑病，以免蔓延成災。